

Sintomas	Constipação	Gripe	Rinite alérgica	Sinusite
Congestão nasal	Sim	Sim	Sim	Sim
Tosse	Sim	Sim		Sim
Má-disposição	Sim	Sim		Ocasional
Dor de garganta	Frequentemente	Ocasional	Sim	Sim
Corrimento nasal	Sim		Sim	Sim
Espirros	Sim	Ocasional	Sim	
Rinorreia	Pode ser espessa e amarela	Turva	Clara e fina	Espessa e amarela a verde
Duração	5-7 dias	2-3 semanas	Episódica	Perpétua, se não for tratada
Dor generalizada		Sim, frequentemente severa		Ligeira
Suores/arrepios		Sim		
Exaustão extrema		Inicial e prominente		
Fadiga/fraqueza	Ligeira	Sim	Ligeira/sim	Sim
Febre	Rara	> 38,5°C, 3-4 dias		Baixa
Dor de cabeça	Rara	Sim		Sim
Comichão nos olhos, nariz ou garganta			Sim	
Padrão sazonal	Sim	Sim	Sim	Sim
Garganta irritada	Sim			Sim
Dor facial				Sim
Mau hálito				Sim

Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica. Livostin colírio está indicado no tratamento sintomático da conjuntivite alérgica (conjuntivite clássica e primaveril) com diagnóstico médico prévio. Contra-indicado em doentes com hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer dos excipientes. Contém cloreto de benzalcónio que pode causar irritação ocular. Os doentes em tratamento não devem utilizar lentes de contacto moles (hidrofilicas). Livostin solução para inalação por nebulização está indicado no tratamento sintomático da rinite alérgica perene ou sazonal com diagnóstico médico prévio. Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer dos excipientes. Deve ser administrado com precaução em doentes com insuficiência renal. Contém cloreto de benzalcónio como conservante, podendo causar tumefacção da mucosa nasal, especialmente quando utilizado durante longos períodos. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas durante o tratamento com Livostin. Leia atentamente o folheto informativo. Em caso de dúvida ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Livostin®

Liberte-se rapidamente das alergias

Johnson & Johnson Lda.

JNJ/119/2010/LIV